

А.А.Быков, [bykv@mail.ru](mailto:bykv@mail.ru), <http://bykv.narod.ru>

1. Укажите все точки разрыва функции  $y = \frac{1}{\cos x}$  и укажите тип, которому относится каждая точка разрыва

2. Укажите все точки разрыва функции  $y = \cos x \cdot \operatorname{ctg} x$  и укажите тип, которому относится каждая точка разрыва

3. Укажите все точки разрыва функции  $y = \frac{\cos x - 1}{x^2}$  и укажите тип, которому относится каждая точка разрыва

4. Укажите все точки разрыва функции  $y = \frac{e^{x-1} - 1}{x(x^2 - 1)}$  и укажите тип, которому относится каждая точка разрыва

5. Укажите все точки разрыва функции  $y = \frac{x^2 - |x|}{x}$  и укажите тип, которому относится каждая точка разрыва

6. Докажите, что точка  $x = 0$  для функции  $y = \begin{cases} \frac{\cos x}{x} & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{x \cos \frac{1}{x}} & \text{при } x > 0, \end{cases}$  является точкой разрыва. Классифицируйте точку разрыва (устранимый, первого, второго рода)

7. Классифицируйте все точки разрыва функции  $f(x) = \frac{x}{\operatorname{tg} x}$

8. Укажите все верные утверждения: Если функция  $f(x)$  непрерывна в точке  $x = x_0$ , то

- (a)  $f(x)$  имеет касательную в точке  $x_0$ .
- (b)  $f(x) - f(x_0)$  – бесконечно малая функция при  $x \rightarrow x_0$ .
- (c)  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .
- (d) найдется такая окрестность точки  $x_0$ , в которой  $f(x)$  ограничена.
- (e)  $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .
- (f)  $\exists \delta > 0 : \forall a : |a - x_0| < \delta \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

9. Пусть  $y = f(x)$  – непрерывная функция, определенная на промежутке  $[a; b]$ .

Сформулируйте достаточные условия существования обратной функции на промежутке  $[f(b); f(a)]$ .

10. Пусть  $x \rightarrow +\infty$ . Что означает запись  $o(1) + o(1) = o(1)$ ? Если это верно, докажите; если неверно, приведите опровергающий пример.

11. Пользуясь определением и свойствами символа  $O(f)$ , докажите, что на множестве  $x \in [-0.1; 0.1]$  имеет место соотношение  $\sqrt{1 - x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)$  при  $x \rightarrow 0$

12. Докажите, что  $o(x^5) \cdot o(x^4) = o(x^9)$  при  $x \rightarrow 0$

13. Пусть  $f(x)$  – бесконечно малая функция при  $x \rightarrow a$  и  $\exists \delta > 0 : \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) \neq 0$ . Что означает формула  $o(f^3) \cdot o(f^4) = o(f^7)$ ? Докажите или приведите опровергающий пример.

**14. Теорема.**  $o(x^3) + o(x^5) = o(x^\gamma)$  при  $x \rightarrow +0$ . Заметим, что в формулировке теоремы не указано значение  $\gamma$ . Укажите все возможные значения  $\gamma$ , при которых теорема будет верной.

**15.** Предположим, что верно утверждение  $f(x) = o(1/x)$  при  $x \rightarrow +\infty$ . Укажите все утверждения, которые при этом условии также будут верны: (a)  $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(b)  $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  (c)  $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$  (d)  $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/x = 0$

(e)  $\exists A, \exists B : \forall x : x > B \Rightarrow |f(x)| \leq A$  (f)  $\exists A, \exists B : \forall x : x > B \Rightarrow |f(x)| \leq A|x|$

**16.** Докажите, что если  $f(x) = o(x^2 + o(x^2))$  при  $x \rightarrow a$ , то  $f(x) = o(x^2)$  при  $x \rightarrow a$ .

**17.** Пусть  $f(x) = 2x - x^2 + o(x^2)$ ,  $g(x) = x - x^2 + o(x^2)$  при  $x \rightarrow 0$ ,  $f(0) = 0$ ,  $g(0) = 0$ . Докажите, что  $\exists p, q : g(f(x)) = px + qx^2 + o(x^2)$  при  $x \rightarrow 0$ . Найдите значения коэффициентов  $p, q$ .

**18.** Докажите, что  $\sqrt{1 - 2x} = 1 - x + o(x)$  при  $x \rightarrow 0$ . Вычислите приближенно  $\sqrt{1.06}$

**19.** Используя формулы  $\sin x = x + \gamma x^3 + o(x^3)$ , при  $x \rightarrow 0$ ,  $\gamma$  – неизвестная константа,  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$  и  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  докажите, что  $\gamma = -\frac{1}{6}$

**20.** Пользуясь определением и свойствами символа  $o(f)$ , докажите, что  $\sqrt{1 - x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$  при  $x \rightarrow 0$

**21.** Используя формулу  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$ , докажите, что  $\sin 3x = px + qx^3 + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$  и найдите значения коэффициентов  $p, q$

**22.** Используя формулы  $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4)$  и  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$ , докажите, что  $\sin(\operatorname{tg} x) = px + qx^3 + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$  и найдите значения коэффициентов  $p, q$

**23.** Используя формулу  $\sqrt[n]{1+x} = 1 + \frac{x}{n} + o(x)$  при  $x \rightarrow 0$ , вычислите предел  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 - 2x^2} - \sqrt[3]{x^3 - 5x^2})$

**24.** Пусть в некоторой окрестности точки  $x = 0$  определена, непрерывна и возрастает функция  $f(x)$ , в некоторой окрестности точки  $x = 0$  определена обратная функция  $f^{-1}(x)$ . Предположим, что функция  $f(x)$  может быть представлена в виде  $f(x) = 2x + 4x^3 + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$ , а функция  $f^{-1}(x)$  может быть представлена в виде  $f^{-1}(x) = px + qx^3 + o(x^4)$  при  $x \rightarrow 0$ . Найдите значения коэффициентов  $p, q$