

На выполнение работы отводится 90 минут. Ответы на вопросы формулируйте в письменной форме. Переписывать вопросы не нужно, пишите только ответы. Отвечать на вопросы можно в произвольном порядке. Писать что-либо на варианте с заданиями не разрешается. Формулируйте ответы кратко, используйте символы  $\forall$ ,  $\exists$ ,  $\lim$  и т.д. вместо соответствующих слов. В начале работы просмотрите все вопросы и отметьте те, ответы на которые Вы знаете хорошо. В первые 45 минут работы не тратьте на один вопрос более 5 минут. По окончании работы Вы сдадите вариант с заданиями и Ваши ответы в письменной форме экзаменатору. После 15-минутного перерыва начнется устная часть экзамена, в ходе которой экзаменатор проверит Ваши ответы в Вашем присутствии. При этом Вам могут быть заданы как уточняющие вопросы, так и дополнительные вопросы по темам, не вошедшим в Ваш вариант. Положительную оценку можно получить, ответив не на все вопросы. Желаем успеха!

**1.** Сформулируйте определение: "Функция  $y = f(x)$  не является бесконечно большой положительной при  $x \rightarrow a$ ", т.е. отрицание к утверждению  $f(x) \rightarrow +\infty$

**2.** Докажите, что если  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ,  $\exists \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B \neq 0$ , то  $\exists \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ .

**3.** Отнесите каждую из следующих последовательностей:

(I)  $x_n = \frac{2^n}{n^3}$  (II)  $x_n = \frac{\log_{2003} n}{n^2}$  (III)  $x_n = \frac{n!}{n^n}$  (IV)  $x_n = \frac{n!}{2^n}$  (V)  $x_n = \frac{n^n}{2^n}$  (VI)  $x_n = \frac{(1,0001)^n}{\log_2 n + 1}$  к одному из следующих типов:

- (a) Последовательность  $x_n$  является бесконечно большой положительной.
- (b) Последовательность  $x_n$  является бесконечно большой, но не является бесконечно большой положительной.
- (c) Последовательность  $x_n$  является неограниченной, но не является бесконечно большой.
- (d) Последовательность  $x_n$  – ограниченная, но не является сходящейся.
- (e) Последовательность  $x_n$  сходится, но не является бесконечно малой.
- (f) Последовательность  $x_n$  – бесконечно малая.

**4. (a)** Сформулируйте отрицание определения фундаментальной последовательности (т.е. определение последовательности, которая не является фундаментальной).

**(b)** Докажите, что фундаментальная последовательность является ограниченной.

**5.** Сформулируйте определение предела функции при  $x \rightarrow +\infty$  по Гейне. Докажите, что если существует упомянутый предел "по Гейне", то существует и предел "по Коши" и эти пределы равны.

**6.** Сформулируйте определение того, что данное число  $b$  не является предельной точкой последовательности, используя понятие окрестности.

**7.** Пусть  $y = f(x)$  – возрастающая функция, определенная на сегменте  $[a; b]$ . Сформулируйте необходимые условия существования обратной функции на промежутке  $[f(a); f(b)]$ .

**8.** Докажите, что функция, непрерывная на сегменте, ограничена сверху на этом сегменте

**9.** Докажите, что если функция  $f(x)$  непрерывна на сегменте  $[a; b]$ , то  $\exists c \in [a; b] : \forall x \in [a; b] f(x) \geq f(c)$ .

**10.** Если функция  $f(x)$  определена на  $[a; b]$ ,  $f(a) < f(b)$ , и  $\exists c \in (f(a); f(b))$ : уравнение  $f(x) = c$  не имеет корней на  $(a; b)$ , то (завершите формулировку и докажите)

**11.** Используя обобщенную формулу конечных приращений (формулу Коши), докажите, что если  $f(x)$  и  $g(x)$  дифференцируемы на промежутке  $(a; b)$ ,  $c \in (a; b)$ ,  $f(c) = 0$ ,  $g(c) = 0$ ,  $\forall x \in (a; b) g'(x) \neq 0$ , и  $\exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ , то  $\exists \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ . В каком месте доказательства использовано условие  $g'(x) \neq 0$ ?

**12.** Сформулируйте определение дифференциала функции  $f(x)$ . Докажите, что если существует дифференциал функции  $f(x)$  в точке  $x = x_0$ , то  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha(\Delta x)$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ , где  $\alpha(\Delta x)$  – бесконечно малая функция. Используя эту формулу для  $x_0 = \frac{2\pi}{3}$ , найдите приближенное значение для величины  $\sin 2$ . Оценку погрешности производить не обязательно.

**13.** Предположим, что  $u(t)$  – функция независимой переменной  $t$ . Вычислите первый и второй дифференциалы сложной функции  $y = e^{-u}$ . Поясните на этом примере, что означает "инвариантность формы первого дифференциала" и "неинвариантность второго дифференциала"

**14.** Запишите формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для функции  $f(x) = \ln(1+x)$  с центром в точке  $x_0 = 0$  для  $n = 3$  ( $n$  – степень многочлена Тейлора). Используя формулу Тейлора, вычислите приближенно значение  $\ln(1,5)$ . Выполните оценку остаточного члена.

**15.** Сформулируйте достаточные условия перегиба графика функции, использующие только первую производную.

**16.** Сформулируйте признак Даламбера для сходимости (расходимости) числового ряда с положительными членами в форме, использующей предел некоторой последовательности. Докажите ту часть признака, которая гарантирует отсутствие сходимости.

**17. Теорема.**  $o(x^4) + o(x^\gamma) = o(x^3)$  при  $x \rightarrow +0$ . Заметим, что в формулировке теоремы не указано значение  $\gamma$ . Укажите все возможные значения  $\gamma$ , при которых теорема будет верной.

**18.** Пусть значение параметра  $p$  таково, что уравнение  $x^8 + \frac{72}{x} = p$  имеет ровно два различных корня. Найдите больший корень

**19.** Докажите, что если  $f'(x_0) = 0$ ,  $f''(x_0) = 0$ ,  $f'''(x_0) = 0$ ,  $f^{(4)}(x_0) = 0$ ,  $f^{(5)}(x_0) \neq 0$ , то в точке  $x_0$  функция  $y = f(x)$  не имеет локального экстремума.

**20.** Пусть  $f(x) = \begin{cases} x^3 \cos \frac{1}{x^2} & \text{если } x \neq 0, \\ 0 & \text{если } x = 0. \end{cases}$   
Докажите, что  $\exists f'(x)$  при  $x \neq 0$ ,  $\exists f'(x)$  при  $x = 0$ ,  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ .