

На выполнение работы отводится 90 минут. Ответы на вопросы формулируйте в письменной форме. Переписывать вопросы не нужно, пишите только ответы. Отвечать на вопросы можно в произвольном порядке. Писать что-либо на варианте с заданиями не разрешается. Формулируйте ответы кратко, используйте символы  $\forall$ ,  $\exists$ ,  $\lim$  и т.д. вместо соответствующих слов. В начале работы просмотрите все вопросы и отметьте те, ответы на которые Вы знаете хорошо. В первые 45 минут работы не тратьте на один вопрос более 5 минут. По окончании работы Вы сдадите вариант с заданиями и Ваши ответы в письменной форме экзаменатору. После 15-минутного перерыва начнется устная часть экзамена, в ходе которой экзаменатор проверит Ваши ответы в Вашем присутствии. При этом Вам могут быть заданы как уточняющие вопросы, так и дополнительные вопросы по темам, не вошедшим в Ваш вариант. Положительную оценку можно получить, ответив на все вопросы. Желаем успеха!

**1.** Сформулируйте определение: "Функция  $y = f(x)$  не имеет предела при  $x \rightarrow a$ "

**2.** Предположим, что верно утверждение  $f(x) = o(x)$  при  $x \rightarrow 0$ . Укажите все утверждения, которые при этом условии также будут верны:

- 1**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 0$    **2**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x) = 0$    **3**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$    **4**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} x f(x) = 0$    **5**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$   
**6**  $\exists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

**3.** Пусть  $x_n = \frac{1}{n^2 \cdot \ln n}$ ,  $n > 1$ ;  $x_1 = 1$  – последовательность. Укажите все верные утверждения из числа перечисленных далее: (a)  $x_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$  (b)  $x_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$  (c)  $x_n = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$  (d)  $x_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$   
(e)  $x_n = o\left(\frac{1}{n^3}\right)$  (f)  $x_n = O\left(\frac{1}{n^3}\right)$

**4. (a)** Сформулируйте определение фундаментальной последовательности.

(b) Докажите, что фундаментальная последовательность имеет единственную предельную точку.

**5.** Сформулируйте определение функции, не имеющей предела при  $x \rightarrow +\infty$  "по Гейне". Докажите, что если существует  $\lim_{x \rightarrow +\infty}$  "по Коши", то существует и предел "по Гейне" и эти пределы равны.

**6.** Докажите, что если число  $b$  является предельной точкой последовательности по определению, использующему понятие окрестности, то то же число является предельной точкой последовательности по определению, использующему понятие подпоследовательности

**7.** Сформулируйте теорему о дифференцировании обратной функции. Вычислите производную функции  $y = \arcsin x$

**8.** Объясните, в каком месте нарушится ход доказательства первой теоремы Вейерштрасса, если в условии теоремы заменить "сегмент" на "интервал"

**9.** Докажите, что если функция  $f(x)$  непрерывна на сегменте  $[a; b]$ , то  $\exists c \in [a; b] : \forall x \in [a; b] f(x) \leq f(c)$ .

**10.** Сформулируйте теорему о свойстве непрерывной функции, принимающей значения противоположных знаков на концах сегмента  $[a, b]$ .

**11.** Сформулируйте и докажите правило Лопитала для вычисления  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ . В каком месте доказательства использовано условие  $g'(x) \neq 0$ ?

**12.** Сформулируйте определение дифференциала функции  $f(x)$ . Докажите, что если  $\exists A : f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$  при  $\Delta x \rightarrow 0$ , то  $\exists f'(x)$  в точке  $x = x_0$ . Используя эту формулу для  $x_0 = 32$ , найдите приближенное значение для величины  $\sqrt[5]{33}$ . Оценку погрешности производить не обязательно.

**13.** Предположим, что  $x = u(t)$  – функция независимой переменной  $t$ . Вычислите первый и второй дифференциалы сложной функции  $y = \frac{1}{x}$ . Поясните на этом примере, что означает "инвариантность формы первого дифференциала" и "неинвариантность второго дифференциала"

**14.** Запишите формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для функции  $f(x) = e^x$  с центром в точке  $x_0 = 0$  для  $n = 4$  ( $n$  – степень многочлена Тейлора). Используя формулу Тейлора, вычислите приближенно значение  $e^1$ . Выполните оценку остаточного члена.

**15.** Сформулируйте достаточные условия перегиба графика функции, использующие вторую производную.

**16.** Сформулируйте признак Коши сходимости числового ряда с положительными членами в той форме, которая не использует предел некоторой последовательности. Докажите необходимое условие сходимости. Приведите пример.

**17. Теорема.**  $o(x^3) + o(x^5) = o(x^\gamma)$  при  $x \rightarrow +0$ . Заметим, что в формулировке теоремы не указано значение  $\gamma$ . Укажите все возможные значения  $\gamma$ , при которых теорема будет верной.

**18.** Пусть значение параметра  $p$  таково, что  $p > 0$  и уравнение  $\tan x = 7 \sin x - p$  имеет единственный корень на промежутке  $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ . Найдите этот корень

**19.** Докажите, что если  $f'(x_0) = 0$ ,  $f''(x_0) = 0$ ,  $f'''(x_0) = 0$ ,  $f^{(4)}(x_0) \neq 0$ , то найдется такая окрестность точки  $x_0$ , в которой уравнение  $f(x) = f(x_0)$  имеет единственное решение  $x = x_0$ .

**20.** Пусть  $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\ln|x|} & \text{если } x \neq 0, \\ 0 & \text{если } x = 0. \end{cases}$

Докажите, что  $\exists f'(x)$  при  $x = 0$  и  $f'(0) = 0$ .